

Số: ~~1603~~ KSBT-BTN

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 11 năm 2019

V/v: Trả lời HUE-S về việc tình trạng
Sốt xuất huyết nguy hiểm.

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo chỉ đạo của Sở Y tế về việc trả lời nội dung phản ánh trên dịch vụ đô thị thông minh HUE-S.

Mã phản ánh: 211119008

Nội dung phản ánh:

1. Hoạt động phun thuốc phòng chống muỗi sẽ được triển khai vào thời điểm nào?

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xin trả lời như sau:

Thực hiện QĐ 3711/QĐ – BYT. Về việc ban hành “ hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh sốt xuất huyết dengue”.

1.1. Phun hóa chất diệt muỗi chủ động diện rộng:

- **Mục đích:** Chủ động triển khai phun hóa chất diệt muỗi kết hợp với chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy ngay từ khi có nguy cơ nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bùng phát.

- **Chỉ định:**

+ Nơi có nguy cơ cao xảy ra dịch và

+ Có ca bệnh và có chỉ số mật độ muỗi cao ($\geq 0,5$ con/nhà) hoặc chỉ số lăng quăng/bọ gậy cao (Breteau (BI) ≥ 30); riêng khu vực miền Bắc chỉ số mật độ muỗi cao ($\geq 0,5$ con/nhà) hoặc chỉ số bọ gậy cao (BI ≥ 20).

- **Thời gian triển khai:** Số lần phun từ 2 - 3 lần tùy thuộc hiệu quả diệt muỗi, chỉ số mật độ muỗi, tình hình dịch SXHD...

- **Phun lần 1:** Tùy điều kiện từng tỉnh, bố trí thời gian tổ chức phun hoá chất diệt muỗi phù hợp, thời gian phun 1 đợt tại khu vực địa lý nhất định không quá 10 ngày.

- **Phun lần 2:** Phun cách lần 1 từ 7 - 10 ngày.

- **Phun lần 3:** Việc chỉ định phun lần 3 căn cứ vào các chỉ số điều tra véc tơ sau phun lần 2 từ 1 - 2 ngày (chỉ số mật độ muỗi DI $> 0,2$ con/nhà; chỉ số BI ≥ 20). Thời gian phun lần 3 sau phun lần 2 từ 7 - 10 ngày.

- Thời gian phun: tốt nhất vào buổi sáng sớm (6 - 9 giờ) hoặc chiều tối (17 - 20 giờ). Nhiệt độ môi trường phù hợp nhất để phun từ 18°C - 25°C , hạn chế phun khi nhiệt độ $> 27^{\circ}\text{C}$.

- Tốc độ gió: chỉ phun khi tốc độ gió từ 3 - 13 km/giờ (gió nhẹ), không phun khi trời mưa hoặc gió lớn.

- **Kỹ thuật phun bằng máy phun ULV đeo vai**

- Kỹ thuật phun bằng máy phun ULV đeo vai trong nhà: Phun theo nguyên tắc cuốn chiếu.

+ Máy phun: Kiểm tra nhiên liệu, kiểm tra đầu phun (sử dụng máy phun có đầu vòi phun ULV với kích thước hạt nhỏ hơn $30\mu\text{m}$). Chạy máy để thử liều lượng phun.



+ Người đi mang máy đứng ở cửa ra vào hoặc cửa sổ, để chếch vòi phun khoảng 45°, không kê sát vòi phun vào vách hay các vật dụng trong nhà. Mỗi phòng (nhà) có diện tích từ 20 - 30m² thời gian phun khoảng 5 - 10 giây với mức phun mạnh nhất.

+ Đối với phòng lớn thì phun theo kiểu đi giạt lùi, từ trong ra ngoài, phòng nhỏ, phòng đơn chỉ cần chữa vòi phun qua cửa chính hoặc qua cửa sổ mà không cần vào trong phòng.

+ Đối với nhà chung cư, nhà ở có nhiều tầng, nhiều phòng cần phun tất cả các phòng, các góc, cầu thang, sân thượng... với nguyên tắc phun từ tầng trên xuống tầng dưới, từ trong ra ngoài bằng cách đi giạt lùi hết phòng này qua phòng khác. Khi di chuyển từ phòng này sang phòng kia giữ đầu vòi hướng lên trên để phần còn lại của thuốc được phát tán ra khu vực. Không chữa đầu vòi xuống đất.

+ Không phun trực tiếp vào người và động vật nuôi.

+ Diện tích của từng nhà, từng phòng cần được tính ra mét vuông (m²) trên cơ sở đó tính lượng hóa chất cần có để pha thành dung dịch.

1.2. Xử lý ổ dịch Sốt xuất huyết đen:

- Ổ dịch SXHD: Một nơi (tổ, khu phố/xóm/ấp, cụm dân cư hoặc tương đương) được xác định là ổ dịch SXHD khi có các ca bệnh lâm sàng xảy ra trong vòng 7 ngày hoặc một ca bệnh SXHD được chẩn đoán xác định phòng xét nghiệm, đồng thời phát hiện có lăng quăng/bọ gậy hoặc muỗi truyền bệnh trong phạm vi bán kính 200 mét.

Khi có ổ dịch đều phải xử lý theo quy định. Ổ dịch SXHD được xác định chấm dứt khi không có ca bệnh mới trong vòng 14 ngày kể từ ngày khởi phát của ca bệnh cuối cùng.

- Quy mô xử lý ổ dịch **Sốt xuất huyết đen**

+ **Khi có 1 ổ dịch SXHD xử lý khu vực phạm vi bán kính 200 mét kể từ nhà bệnh nhân.**

+ Trường hợp có từ 3 ổ dịch SXHD trở lên tại một thôn/ấp hoặc tương đương trong vòng 14 ngày: thì xử lý theo quy mô thôn/ấp và có thể mở rộng khi dịch lan rộng.

- Thời gian thực hiện

Các biện pháp xử lý ổ dịch SXHD phải được triển khai trong vòng 48 giờ kể từ khi ổ dịch được xác định.

2. Người dân phải liên hệ đơn vị nào nếu thấy khu vực mình sinh sống cần được phun thuốc?

- Người dân có thể báo cho Trạm y tế phường hoặc trung tâm y tế Thành phố tại địa bàn nơi mình cư trú biết để điều tra xác định các chỉ số côn trùng (mật độ muỗi, mật độ lăng quăng/bọ gậy) tại địa phương và đề ra các biện pháp xử lý thích hợp cho từng trường hợp cụ thể.

3. Trường hợp người dân muốn chủ động phòng chống thì loại thuốc nào được Bộ Y tế cấp phép, mua được ở đâu, cách sử dụng và có khuyến cáo gì từ cơ quan chuyên môn?

- Các loại thuốc được Bộ Y tế cấp phép sử dụng trong Phun PCD SXHD hiện nay: Han pec, Viper, Permethine, Hantox...

- Hiện nay các loại thuốc trên trong phòng chống Sốt xuất huyết được khuyến cáo phun theo dạng ULV(phun sương theo máy đặt chùng) không dùng các máy phun thông thường và có cán bộ kỹ thuật hướng dẫn.



- Nếu muốn chủ động phun diệt muỗi cho gia đình và các đơn vị cá nhân. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sau khi khảo sát đã nắm bắt được đơn vị có khả năng và đủ điều kiện phun hóa chất diệt muỗi theo dạng dịch vụ tại thành phố Huế như sau: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÁT THIỆN, SỐ ĐKKD: 3102000145, địa chỉ 534 Lê Duẩn, thành phố Huế, điện thoại: 02343580961, Email: huephathico@yahoo.com.vn. Do đó để phun dịch vụ cho các gia đình, đơn vị cá nhân thì nên liên hệ địa chỉ trên để được tư vấn và xử lý.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật xin báo cáo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PCBTN.



GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH TT. HUẾ
Nguyễn Khoa Nguyễn

THIÊN
HUẾ